?????? ?????? "????????????????? ??????????????????????????????????????"

???????? Administrator
????????????? 08 ??????? 2013 ???? 09:48 ?. - ??????????? ????????????? 08 ??????? 2013 ???? 10:02 ?.

???????????????????????????????????????

???????? Administrator
????????????? 08 ??????? 2013 ???? 09:48 ?. - ??????????? ????????????? 08 ??????? 2013 ???? 10:02 ?.

ส่วนใหญ่ผิวหนังอักเสบมักจะเกิดที่ขาหรือเท้าเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน เนื่องจากมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย แต่ก็อาจจะเกิดที่ตำแหน่งอื่นได้ด้วย เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผิวหนังอักเสบมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกรัมบวก โดยเฉพาะ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส และบางครั้ง สเตรปโตค็อกคัส ไพโยจีนีส แต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ก็อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียกรัมลบหรือเชื้อจำเพาะบางอย่าง

๒. การอักเสบเน่าตายของเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง

หมายถึงการติดเชื้อที่ลุกลามตั้งแต่ผิวหนัง ชั้นใต้ผิวหนัง จนถึงชั้นพังผืด พบได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน เม็ดเลือดขาวต่ำ มะเร็ง แต่ก็พบได้ในผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวเช่นกัน

เชื้อที่เป็นสาเหตุ ประมาณ ๒ ใน ๓ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดร่วมกัน อีกประมาณ ๑ ใน ๓ เกิดจากเชื้อชนิดเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกรัมบวก โดยเฉพาะ สเตรปโตค็อกคัส ไพโยจีนีส

อาการทางคลินิกที่ต้องสงสัยถึงการติดเชื้อที่ลุกลามลึกขึ้นพังผืดคือ **ผู้ป่วยมักจะมีอาการบวมของผิวหนังนอกบริเวณอักเสบบนผิวหนัง และอาการปวดรุนแรงมากกว่ารอยโรคที่เห็น** สีผิวหนังเปลี่ยนไป ร่วมกับมีจุดน้ำเกิดขึ้นบนรอยโรค ผู้ป่วยมักมีอาการรุนแรง จนถึงความดันโลหิตต่ำได้ การดำเนินโรคของภาวะนี้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะที่เกิดจาก สเตรปโตค็อกคัส ไพโยจีนีส

การรักษา

แนวทางการรักษาผู้ที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังอักเสบคือ การใช้ยาปฏิชีวนะ การรักษาประคับประคองต่างๆ และการผ่าตัดระบายหนองหรือเอาเนื้อเยื่อเน่าตายออก ซึ่งมีความสำคัญมากในการรักษาการอักเสบเน่าตายถึงชั้นฟาสเซีย

ยาปฏิชีวนะที่เลือกใช้โดยทั่วไปมักจะให้ครอบคลุมเชื้อ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส และ/หรือ สเตรปโตค็อกคัส ไพโยจีนีส เป็นหลัก โดยอาจจะให้ในรูปยาฉีดก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นยากินตามหลัง ระยะเวลาที่ให้ยารักษาอย่างน้อย ๗-๑๔ วัน หรืออนไม่ต้องทำการผ่าตัดระบายหนองหรือเอาเนื้อเยื่อเน่าตายออก

ดังนั้น เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นจากการชี่ตช่วงเริ่มแทง ควรจะรีบทำความสะอาดตัวแผ้ง สะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทันที ถ้ามีอาการบวม แสงร้อน ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษา โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคลุกลาม เช่น เบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดอยู่

ภาพที่ 1 ผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ

ภาพที่ 2 เนื้อเยื่อเน่าตายถึงชั้นฟาสเซียจากการติดเชื้อ