

???????? Administrator

???????????????? 26 ?????? 2022 ????? 15:05 ? . - ????????????? ????????????????? 26 ?????? 2022 ????? 15:15 ? .



?? 5
??



คำชี้แจง เรื่อง โรคฝีดาษวานร

ด้วยสถานการณ์ด้านที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีการระบาดของโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ในประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศที่ไม่เคยเป็นแหล่งระบาดของโรคนี้มาก่อน ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ สร้างความเสียหายในหลายด้านคล้ายกับโควิด-19 นั้น องค์การวิชาชีพทางการแพทย์ขอให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจทราบวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปกติ ดังนี้


1. โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แล้วแพร่ไปสู่สัตว์ชนิดอื่น ที่มีรายงานครั้งแรกคือการติดเชื้อในลิงที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง จิงจิง กวาง ฝอยขาว หรือ ฝอยดำ ลิง ลิงชิมแปนซี ไม่ใช้แหล่งรังโรค และยังไม่มียารักษาการติดเชื้อนี้ในสัตว์ประเภทฟันแทะในประเทศไทย
2. การติดเชื้อที่มีรายงานในอดีต มักเกิดในสัตว์เลี้ยง หรือคน ที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ฟันแทะ แต่การระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ยังไม่ทราบต้นตอที่แน่ชัด คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับสัตว์ป่าในทางใดทางหนึ่ง ยังต้องรอการสอบสวนโรคอีกระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะชี้ชัดได้ว่าการระบาดมีมาจากสาเหตุใด
3. การแพร่เชื้อจากผู้ป่วย อาจจะเริ่มตั้งแต่มีอาการไข้ และจะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้มากที่สุด ในช่วงระยะเวลามีผื่นขึ้นตามตัว ซึ่งต่างจากโควิด-19 ที่สามารถแพร่ได้แม้ผู้ติดเชื้อยังไม่มีอาการ ดังนั้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสโรคได้ง่ายกว่า
4. การระบาดในประเทศต่าง ๆ ยังไม่กว้างขวางมากนักจึงต้องห้ามการเดินทางข้ามของคชจากประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากพบคนเดินทางจากประเทศที่มีรายงานการพบโรค มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่มีผื่นและคัมภีร์ไปตามแขนขาและใบหน้าหลังจากมีไข้แล้ว 2-3 วัน
5. ถ้ามีการติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะหายได้เองโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ ไว้ตามร่างกายหากไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจมีอาการรุนแรง องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคนี้มีอัตราตายประมาณ 3.6%
6. หลักเล็งการกักกันโรคกับนักท่องเที่ยวที่มีการตามข้อ 4 และมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาด
7. การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ผู้ป่วย และการล้างมือหลังการสัมผัสผู้ป่วย เป็นวิธีการที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้




8. หลักเล็งการนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือบริโภค เพราะอาจนำเชื้อก่อโรคชนิดใหม่ ๆ รวมทั้งโรคฝีดาษวานรมาติดและแพร่ระบาดได้
9. วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ จะป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ด้วย แต่เนื่องจากประเทศไทยผลิตวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษมาแล้วเกือบ 50 ปี ดังนั้น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้จากการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ แต่ผู้ที่ย้ายมาอยู่จะไม่มีภูมิคุ้มกัน แต่เมื่อโอกาสที่โรคนี้จะแพร่ระบาดมาถึงประเทศไทยได้น้อย ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปจะต้องเร่งรับวัคซีนนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


(พลโท รักษาราชการ นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์)
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ ไล่ให้แสง)
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิญญู มุกสิกพันธุ์)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย


(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุบลกัญญา ไรตโณกุลย์กิจ)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


(นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)
นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

???????????????????????????????? 5 ?????????????????????????????

???????? Administrator

???????????????? 26 ????? 2022 ??? 15:05 ?. - ????????????????????????? 26 ?????
2022 ??? 15:15 ?.
